



Motion om gångtest vid misstänkt nedsatt arbetsförmåga i samband med KOL

Patienter som drabbats av KOL har behov av vård och stöd inom flera områden. Det finns både enkla och avancerade metoder för att vårda och diagnostisera patienter som har KOL. Ett enkelt och relativt resurssnålt sätt att mäta en patients fysiska kapacitet vid KOL är att utföra 6 minuters gångtest. Gångtest är en känd och beprövad metod som dessutom är ofarlig för patienten.

Vid ett gångtest övervakar personalen patientens hjärtfrekvens, syrgasmättnad samt andningspåverkan. Mätningarna från detta gångtest är viktig information när man senare skall fastställa patientens sjukdomsstatus och göra en prognos. Således får man fram ett starkt underlag för att säkerställa att KOL-patienten får en fortsatt korrekt behandling. Detta underlag kan även ligga till grund för ett eventuellt träningsprogram.

Ett 6 minuters gångtest är billigt, säkert och ger mycket värdefull information. Socialstyrelsen rekommenderar starkt att detta gångtest införs vid stadie 2 till 4.

Vi ser att här finns utvecklingspotential och anser att detta bör införas i större grad i vårt landsting.

Med anledning av vad som anförs ovan yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting:

Att möjligheterna undersöks om att införa sex minuters gångtest eller liknande för patienter med KOL, stadium 2-4, som har misstänkt nedsatt fysisk kapacitet, med målet att få in detta som rutin där det anses motiverat.

Karlstad den 13 april 2015

Anders Ahl (SD) Anina Laroma (SD) Marcus Karlsson (SD) Runar Filper (SD) Harriet Ulricci (SD) Lisbeth Jarnbro (SD)